အိပ်စက်ခြင်းကျန်းမာရေးနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုထိန်းချုပ်စီမံခြင်း

sata CommHealth

အိပ်စက်ခြင်းဟာ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း

ကလေးမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ် အား **အလိုလိုကုသခြင်း၊ အနာသက်သာခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာဖြစ်ခြင်းမှ အကာကွယ်ပေးသည်။**

အိပ်ရေးမဝခြင်းသည် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှု နှင့် နာတာရှည်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများတိုးစေသည်။

မည်သည့်အချိန်တွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းက အန္တရာယ်ရှိသနည်း?

အမြဲနေရောများတွင် အလုပ်လုပ်ရသည့်အချိန် စက်များကို မောင်းနှင် သုံးစွဲခြင်း

အိပ်ရေးမဝခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ

- အိပ်စက်ပြီးတာတောင်မှ ပင်ပန်းသလို ခံစားရခြင်း။
- မကြာခဏ သမ်းခြင်း၊ မျက်လုံးများလေးလံခြင်း
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခေါင်းမူးခြင်း
- စိတ်တိုဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံ့ဆော်မှုစိတ်လျှော့နည်းခြင်း
- ပျော်ကင်းလာခြင်းမရှိသော ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခြင်း
- လုပ်ငန်းခွင်၌ အာရုံစိုက်ရန် ခက်ခဲခြင်း

အိပ်စက်ခြင်းသည် အပျင်းထူခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဘေးကင်းရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဖြစ်သည်။

အဖြစ်များသော အိပ်စက်ခြင်း စိန်ခေါ်မှုများ

- အလုပ်ချိန်ကာကြွနည်းလွန်းခြင်း
- အလှည့်ကျအလုပ်များ(မနက်အစောပိုင်း သို့မဟုတ် ညပိုင်း အလှည့်ကျအလုပ်ချိန်များ)
- အိပ်ဆောင်တွင်းဆူညံသံ၊ လူထူထပ်ခြင်း၊ မျက်စိအလင်းစူးသော အလင်းရောင်များ
- မိသားစုဒုက္ခရေးကြီးရေး၊အလုပ်ခိုင်မာမှုအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ
- ညဉ့်နက်သည်ထိ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲခြင်း
- လုပ်ငန်းခွင်တွင် နှိုးနှိုးကြားကြားရှိစရေန်သောသော ကဖင်းဓာတ်(ကော်ဖီ၊အားဖြည့်အချိရည်များ)

လက်တွေ့အသုံးချ အိပ်စက်မှု အကျိုးခြုံက်များ

မအိပ်စက်ခင်

နေ့စဉ် တူညီသော အချိန်တွင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နိုးထခြင်းပုံစံပြုပါပါ။

မအိပ်စက်ခင် **မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်း ဖုန်းသုံးခြင်း အားရှောင်ကျဉ်ပါ**

ကဖင်းဓာတ်အား **နှလေးည ၂ဉ နာရီ နောက်ပိုင်း သောက်ခြင်းအား လျှော့ချပါ**

အနားယူရန်အချိန်ရောက်ပြီဟု ခန္ဓာကိုယ်ကို အချက်ပြရန် မျက်နှာကို ဆေးကြောခြင်း သို့မဟုတ် ရေချိုးခြင်းပြုပြုပါပါ။

အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်ခင် ၄ နာရီ မှ ၆ နာရီ အတွင်း လှုပ်ရှားခြင်းသည် အိပ်စက်ခြင်းအား အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သို့သော် မအိပ်စက်ခင် နာရီအနည်းငယ်တွင် လုပ်ခြင်းမှာမူ အထောက်အကူမဖြစ်ပါ။

ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းမှု

အနားယူခြင်းသည် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်
- ၄င်းသည် သင်နှင့် အခြားသူများအား ကာကွယ်ပေးသည်။

အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလွန်ပင်ပန်းခြင်းကို ခံစားရပါက:

- ကိုကြာပြီရမှုးအား စောစော အသိပေးပါ။
- သင်းပယ်သောအနားယူမှုများ ယူပါ။
- အကယ်၍ ခေါင်းမူးခြင်း သို့မဟုတ် အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက စက်များကို မောင်းနှင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

အိပ်စက်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်(အိပ်စက်ဆောင်ပုံစံဖြင့်)

- **နားကပြတပ်ဆင်ခြင်း** သို့မဟုတ် နှုးညံ့သောနောက်ခံအသံ ဖွင့်ခြင်း
- အလင်းရောင်ကာကွယ်ရန် **မျက်လုံးကာ/မျက်နှာသုတ်ပုဝါ** to အသုံးပြုပါ။
- အိပ်စက်မည့်ရေယာ ကို သန့်ရှင်းပြီးသပ်ရပ်စွာထားပါ။
- ပူအိုက်ပါက ပန်ကာအား သသေချောချာ အသုံးပြု၍ အဝတ်အစား အား ပခါပခါပါးပါး ဝတ်ဆင်ပါ။

အလှည့်ကျအလုပ်ချိန်နှင့်အချိန်ကာကြွရှည်မှုများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း

- ခွင့်ပြုပါက **တိုတောင်းသောအနားယူမှုများ**ယူပါ။
- တစ်ရေးတမောအိပ်စက်ခြင်းများ(၁၅ မိနစ်- ၂၀ မိနစ်) - ကာကြွရှည်စွာမအိပ်ပါနှင့်။
- ကွက်သားတင်းအားများလျှော့ကျစရေန် မအိပ်စက်ခင် ပခါပခါပါးပါး အကာကြွလျှော့ပါ။
- ပိတ်ရက်များတွင် အလွန်အကျွံ မအိပ်စက်ပါနှင့် (≤ ၁နာရီ-၂နာရီ)

အစားအသောက်

- ညဘက်နောက်ကျချိန်တွင် လေးလံပြီးအဆီများသော အစားအစာစားခြင်းအား ရှောင်ကျဉ်ပါ။
- အိပ်စက်ရန်အချိန်မတိုင်ခင်တွင် ရအေား လျှော့၍လုံလောက်အောင် သောက်သုံးပါ။
- အိပ်စက်ချိန်မတိုင်ခင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရက်သောက်သုံးခြင်းအား ရှောင်ရှားပါ။
- "အိပ်မောကျစရေန်"အရက်သောက်သုံးခြင်းအား ရှောင်ကျဉ်ပါ။ (အိပ်စက်နိုင်သည့်အရည်အသွေးအား ပိုဆိုးစေသည်။)

အိပ်စက်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး

- အိပ်ရေးမဝခြင်းသည် ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်:

စိတ်ဖိစီးမှု

စိုးရိမ်ပူပန်မှု

စိတ်မပါလက်မပါဖြစ်ခြင်း

- တစ်စုံတစ်ယောက် စကားပြောခြင်းသည် အထောက်အကူဖြစ်သည် - သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံများ
- အကူအညီတောင်းခံရှာဖွေခြင်းသည် အားသာချက်၏ လက္ခဏာဖြစ်ပြီး အားနည်းချက်မဟုတ်ပါ။

ကျန်းမာရေးအကူအညီအားမည်သည့်အချိန်တွင်ရှာဖွေရန်လိုမည်နည်း

- ၂ ပတ်- ၃ ပတ်ထက်ပို၍ **အိပ်မပျော်ခြင်း**
- အိပ်စက်နေချိန်အတွင်း ဆူညံစွာဟောက်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း
- နှဝေခြင်းဘက် ပြင်းထန်စွာ အိပ်ငိုက်ခြင်း
- ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသော ဝမ်းနည်းမှု သို့မဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုဖြင့် အိပ်စက်ခြင်း ပဋိသန္ဓေများ
- နှဝေခြင်းဘက် အလွန်အကျွံ အိပ်ငိုက်ခြင်း/ နှဝေခြင်းဘက်တွင် မကြာခဏ အိပ်ပျော်သွားခြင်း (အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူကျပ်ခြင်းရောဂါဖစ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်)